

THÔNG BÁO
Về việc Phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 19/2 đến hết cuối tháng 2 năm 2022, thời tiết diễn biến phức tạp, có thể xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại làm giảm sức đề kháng của gia súc, gia cầm, tạo điều kiện cho một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bùng phát như: Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng, Dịch tả lợn... Bên cạnh đó, một số vật nuôi già yếu, còn non có sức đề kháng kém có thể bị chết do đói, rét. Để chủ động phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi, UBND - Ban chăn nuôi thú y xã Kỳ Hải hướng dẫn các biện pháp sau:

1. Đối với trâu, bò

- Chuồng trại: Gia cố, che chắn chuồng trại đảm bảo đủ ấm, không bị gió lùa, mưa hắt làm ẩm, ướt nền chuồng. Trong những ngày rét đậm, rét hại có thể sử dụng củi, trấu, mùn cưa ... để đốt, sưởi cho gia súc.

(Cần chú ý khi đốt lửa sưởi ấm cho gia súc phải đặt khay lửa ở cuối chuồng để khói không tạt vào mặt vật nuôi và đặt tránh xa chất độn chuồng, bạt che để phòng bén lửa gây cháy; trong chuồng nên có ô thoáng phía trên để gió vẫn lưu thông, không tích tụ khí độc trong chuồng để tránh nguy cơ gia súc chết do ngạt khí.)

- Thức ăn: Chủ động nguồn thức ăn dự trữ như rơm rạ, rau khô,..; chế biến thức ăn ủ chua, tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu, bò. Chuẩn bị thức ăn tinh (bột ngô, sắn, cám gạo...), khoáng, Vitamin để cung cấp đủ cho gia súc trong những ngày giá rét.

- Chăm sóc nuôi dưỡng:

+ Cho trâu bò ăn đủ lượng cỏ các loại (là cỏ xanh, cỏ ủ hoặc rơm khô, rơm ủ ure) với lượng từ 30-40kg và 3,5kg thức ăn tinh (là bột ngô, sắn, cám gạo...) trong một ngày đêm đối với 01 trâu, bò khối lượng 300 kg. Bổ sung muối ăn với lượng 15g (tương đương với 3 thìa cà phê) bằng cách hoà vào nước ấm cho trâu, bò uống. Đối với trâu, bò già, yếu; gia súc non cần có chế độ nuôi dưỡng phù hợp để tăng cường phòng chống rét và dịch bệnh.

+ Không thả rông trâu, bò ngoài đồng; phải chủ động đưa trâu, bò về chỗ nuôi nhốt, trong chuồng kín gió, nền chuồng khô ráo, sưởi ấm vào ban đêm; mặc áo chống rét bằng bao tải để giữ ấm cho trâu bò. Không bắt trâu, bò làm việc hoặc chăn thả ngoài trời khi nhiệt độ xuống thấp (dưới 13 độ C).

2. Đối với lợn

- Chuồng trại vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, không để đọng phân, nước thải trong chuồng; che kín xung quanh chuồng nuôi, không để gió lùa nhất là vào ban đêm; làm chuồng úm đối với lợn con theo mẹ. Không cọ rửa chuồng hoặc tắm cho lợn vào những ngày mưa rét nhiệt độ xuống dưới 13 độ C .

- Cho uống đủ nước sạch, bổ sung thêm các Vitamin tổng hợp, men tiêu hoá trộn vào nước uống, thức ăn theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm. Khẩu phần ăn đảm bảo đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng đối với từng đối tượng lợn.

3. Đối với gà

- Chuẩn bị đầy đủ phen, bạt để che chắn, chống gió lùa; bổ sung thêm bóng điện (bóng tròn) để sưởi ấm cho gia cầm trong những ngày rét đậm, rét hại.

- Mật độ nuôi hợp lý đối với gà đẻ: 6-8 con/m²; gà thịt: 8-10 con/m².

- Đảm bảo thức ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng, phù hợp với từng lứa tuổi của gà; cho uống đủ nước sạch, ấm và bổ sung thêm đường Gluco, các loại Vitamin tổng hợp, men tiêu hoá để nâng cao khả năng chống bệnh cho gà.

Ngoài các biện pháp đã thực hiện như trên, đề nghị Cấp ủy, BCS các thôn thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, báo cáo về Ban chăn nuôi thú y xã để phát hiện xử lý kịp thời có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- TT đảng ủy, HĐND, MTTQ xã;
- Các đồng chí chỉ đạo thôn;
- 5/5 thôn;
- Lưu: VT, NN;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Tịnh